

Hoja informativa sobre la gonorrea

La gonorrea es causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Muchos individuos no tienen síntomas. Si los mismos aparecen, normalmente lo hacen 2 a 7 días después de la exposición, pero también pueden tardar unos 30 días en aparecer.

Los síntomas en las mujeres incluyen:

- Excreciones anormales de la vagina, o un aumento de las mismas
- Sensación de ardor al orinar
- Micción frecuente
- Dolor durante el coito
- Sangrado entre períodos menstruales
- Irritación anal, es decir, picazón, dolor, defecaciones dolorosas o sangrado.

Los síntomas en los hombres incluyen:

- Excreciones del pene
- Sensación de ardor al orinar
- Ardor o picazón alrededor del orificio del pene
- Hinchazón y dolor peneano (en la cabeza del pene)
- Dolor o hinchazón de los testículos
- Irritación anal, es decir, picazón, dolor, defecaciones dolorosas o sangrado.

TRANSMISIÓN

La gonorrea se transmite a través de:

- Sexo vaginal, anal u oral
- Autoinoculación (excreciones uretrales o vaginales en el recto de una mujer)
- Madre infectada al neonato durante el parto vaginal

COMPLICACIONES/CONSECUENCIAS

Si no se trata la gonorrea, puede provocar:

- Enfermedad inflamatoria pélvica
- Infertilidad
- Embarazo ectópico (tubárico)
- Dolor pélvico crónico
- Aumento del riesgo de contraer la infección por VIH

Si no se la trata durante el embarazo, la gonorrea puede provocar:

- Parto prematuro
- Ceguera, infección de las articulaciones o una infección de la sangre que amenace la vida en los recién nacidos

TRATAMIENTO

El tratamiento debería incluir:

- Antibióticos (comúnmente cefixima o ceftriaxona) prescritos por un proveedor de servicios de salud
- Tratamiento adecuado de la pareja

PREVENCIÓN

- Absténgase de tener contacto sexual
- Inicie tempranamente el tratamiento de toda ETS
- Utilice siempre y correctamente condones que sean de látex durante el sexo vaginal, anal y oral con penetración del pene
- Use correctamente una barrera de látex para el sexo oral en la vagina o el ano
- Evite todo contacto sexual hasta haber completado el tratamiento

Recomendaciones para evitar la propagación de la infección:

- Tome toda la medicación tal como se lo hayan indicado, aun en caso de que los síntomas desaparezcan.
- En caso de estar infectada(o), notifique a todas sus parejas recientes

Información de contacto:

Para obtener más información acerca de los lugares y servicios médicos de Florida, y de las recomendaciones para el tratamiento, visite nuestro sitio web en http://www.doh.state.fl.us/disease_ctrl/std/clinical/clinical.html o escríbanos por correo electrónico a: HSD_STD@doh.state.fl.us.

Línea directa nacional sobre las ETS
1-800-927-8922 (24 hs., 7 días a la semana)

Español
1-800-344-7432 (8am-2pm EST, 7 días a la sem.)

Personas con discapacidad auditiva
1-800-943-7889 (10am-10pm EST, lun. a vie.)